

Endokarditiskarte

<i>Vorbeugung vor bakterieller Endokarditis</i>	<i>Dosierungsschema</i>			<i>Hinweise für Dosierungsschema</i>																				
<p>Name: _____</p> <p>Geboren: _____</p> <p>benötigt wegen einer Herzerkrankung Schutz vor bakterieller Endokarditis</p> <p>Diagnose: _____</p> <p>Datum: _____</p> <p>Sie haben diese Karte erhalten, weil Sie gefährdet sind, eine bakterielle Endokarditis zu bekommen. Zeigen Sie sie jedem Arzt vor einer Untersuchung oder Behandlung.</p>	<p>30 - 60 min vor Eingriff</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Situation</th> <th style="width: 25%;">Antibiotikum</th> <th style="width: 25%;">Erwachsene</th> <th style="width: 25%;">Kinder</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orale Einnahme</td> <td>Amoxicillin (a)</td> <td>2 g p.o.</td> <td>50 mg/kg p.o.</td> </tr> <tr> <td>p.o. nicht möglich</td> <td>Ampicillin (a,b)</td> <td>2 g i.v.</td> <td>50 mg/kg i.v.</td> </tr> <tr> <td>Penicillin- oder Ampicillinallergie</td> <td>Clindamycin (c,d)</td> <td>600 mg p.o.</td> <td>20 mg/kg p.o.</td> </tr> <tr> <td>Penicillin- oder Ampicillinallergie- p.o. nicht möglich</td> <td>Clindamycin (b,d)</td> <td>600 mg i.v.</td> <td>30 mg/kg i.v.</td> </tr> </tbody> </table>			Situation	Antibiotikum	Erwachsene	Kinder	Orale Einnahme	Amoxicillin (a)	2 g p.o.	50 mg/kg p.o.	p.o. nicht möglich	Ampicillin (a,b)	2 g i.v.	50 mg/kg i.v.	Penicillin- oder Ampicillinallergie	Clindamycin (c,d)	600 mg p.o.	20 mg/kg p.o.	Penicillin- oder Ampicillinallergie- p.o. nicht möglich	Clindamycin (b,d)	600 mg i.v.	30 mg/kg i.v.	<p>(a) Penicillin G oder V kann als Alternative verwendet werden</p> <p>(b) Alternativ: Cefazolin, Ceftriaxon 1 g i.v. für Erwachsene bzw. 50 mg/kg i.v. bei Kindern</p> <p>(c) Alternativ Cefalexin: 2 g p.o. für Erwachsene bzw. 50 mg/kg p.o. bei Kindern oder Clarithromycin 500 mg p.o. für Erwachsene bzw. 15 mg/kg p.o. bei Kindern.</p> <p>(d) Cave: Cephalosporine sollten generell nicht appliziert werden bei Patienten mit vorangegangener Anaphylaxie, Angioödem oder Urtikaria nach Penicillin- oder Ampicillingabe.</p>
Situation	Antibiotikum	Erwachsene	Kinder																					
Orale Einnahme	Amoxicillin (a)	2 g p.o.	50 mg/kg p.o.																					
p.o. nicht möglich	Ampicillin (a,b)	2 g i.v.	50 mg/kg i.v.																					
Penicillin- oder Ampicillinallergie	Clindamycin (c,d)	600 mg p.o.	20 mg/kg p.o.																					
Penicillin- oder Ampicillinallergie- p.o. nicht möglich	Clindamycin (b,d)	600 mg i.v.	30 mg/kg i.v.																					

1. Karte ausschneiden
2. an den Querlinien knicken auf Format einer EC-Karte